


MAAP #69: Padrões alarmantes de desmatamento na Amazônia Central Peruana

setembro 26, 2017

Donate



(https://www.maaprogram.org/wp-content/uploads/2017/09/MAAP_NewPatterns_O_v1_en.jpg)

Imagem 69. Mapa Base.

Franklin W. donated \$50 🙏

to Fighting Amazon Fires

🇺🇸 Pennington, United States

Donate


(<http://bit.ly/2fybz3u>) (conhecidos como
os padrões alarmantes de desmatamento em
al peruana.

Elas parecem estar relacionadas a atividades agrícolas de média ou grande escala devido às suas características distintas: **caminhos de acesso retos** que se estendem de estradas secundárias construídas profundamente na floresta primária e **desmatamento de lotes retangulares/quadrados**.

Esses padrões são significativos porque são muito diferentes dos padrões usuais observados na agricultura de pequena escala na Amazônia peruana: parcelas dispersas sem grandes características lineares.

Aqui, mostramos **imagens de satélite de três áreas** na Amazônia central peruana (veja o **Mapa Base**) que recentemente experimentaram esses padrões alarmantes e merecem atenção urgente devido à ameaça de desmatamento rápido de grandes áreas de floresta primária.*

Área de Conservação Regional Norte de Imiria




(https://www.maaprogram.org/wp-content/uploads/2017/09/MAAP_NewPatterns_Imiria_m1_v1_en-1.jpg)

Imagem 69a. Dados: Planeta

Logo ao norte da Área de Conservação Regional de Imiria (região de Ucayali), documentamos a construção de uma nova estrada de acesso e o desmatamento de 445 acres (180 hectares) de floresta primária entre junho e setembro de 2017 (**Imagem 69a**). Na imagem de setembro (painel direito), as características lineares do caminho de acesso e dos lotes agrícolas são claramente vistas. Também parece que há muito potencial para

desmatamento contínuo na floresta primária circundante. Fontes indicam que esse desmatamento está ligado a uma associação agrícola, no entanto, ainda não se sabe para qual tipo de cultivo. O desmatamento está a apenas 2 km da Área de Conservação Regional de Imiría.

Nova Requena (Ucayali)




(https://www.maaprogram.org/wp-content/uploads/2017/09/MAAP_NewPatterns_NR_North_m1_v1_en-1.jpg)

Imagem 69b. Dados: Planeta

Nas florestas primárias restantes do distrito de Nueva Requena (região de Ucayali), documentamos a limpeza de três caminhos lineares, totalizando 9 km, e o subsequente desmatamento de 188 acres (76 hectares) (**Imagem 69b**). Esses caminhos estão localizados dentro de terras florestais nacionais (conhecidas como Floresta de Produção Permanente), indicando que o novo desmatamento é parte de uma invasão ilegal. É importante notar que essa área foi notícia recentemente em relação ao assassinato de seis fazendeiros por disputa de direitos de terra (<https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/06/six-farmers-shot-dead-over-land-rights-battle-in-peru>) e está perto de controversos projetos de óleo de palma em grande escala (MAAP #41 (<https://www.maaprogram.org/2016/plantaciones-de-pucallpa/>)).

Orellana (Loreto)



(https://www.maaprogram.org/wp-content/uploads/2017/09/MAAP_NewPatterns_Orellana_m1_v1_en-1.jpg)

Imagem 69c. Dados: Planeta

Mais ao norte, perto da cidade de Orellana (região de Loreto), documentamos a rápida limpeza de uma série de caminhos lineares, totalizando 19 km, seguido pelo desmatamento de 255 acres (104 hectares) de floresta primária (**Imagem 69c**). Observe o desmatamento na forma de vários lotes retangulares. Como nos exemplos acima, há muito potencial para desmatamento contínuo na floresta primária circundante.

Notas

*De acordo com o Decreto Supremo (nº 018-2015-MINAGRI) que aprova o Regulamento de Gestão Florestal sob a estrutura da nova Lei Florestal de 2011 (nº 29763), a definição oficial de floresta primária no Peru é: “Floresta com vegetação original caracterizada por uma abundância de árvores maduras com espécies de dossel superior ou dominante, que evoluiu naturalmente”. Usando métodos de sensoriamento remoto, nossa interpretação dessa definição são áreas que, desde a primeira imagem disponível, são caracterizadas por densa cobertura de dossel fechado e não sofreram grandes eventos de desmatamento.

Referência

Planet Team (2017). Planet Application Program Interface: No espaço para a vida na Terra. São Francisco, CA. <https://api.planet.com> (<https://api.planet.com/>)

Agradecimentos especiais

Gostaríamos de expressar nossa gratidão a Michael Valqui por suas contribuições durante a preparação deste artigo.

Citação

Finer M, Novoa S (2017) Novos padrões alarmantes de desmatamento na Amazônia central peruana. MAAP: 69.
