

MAAP #77: Pontos críticos de desmatamento na Amazônia colombiana, parte 2

janeiro 29, 2018

Apresentamos o segundo de uma série de mapas de histórias que investigam **os hotspots de desmatamento** na **Amazônia colombiana**. Nosso objetivo é identificar os hotspots mais críticos (áreas com as maiores densidades de desmatamento) e usar imagens de satélite para identificar os principais drivers de desmatamento.

O **primeiro relatório** (<https://www.maaprogram.org-deforestation-patterns-colombian-amazon/>) se concentrou em um ponto crítico próximo ao Parque Nacional Chiribiquete, no departamento de Caquetá, e o desmatamento foi causado em grande parte por pastagens para gado.

Aqui (<https://www.maaprogram.org/colombia2/>), nos movemos para o sul e focamos em um hotspot ao redor **do Parque Nacional La Paya** no Departamento de Putumayo. Mostramos imagens de satélite de alta resolução que revelam que o principal impulsionador é novamente o pasto para gado.

Siga este link para visualizar o Mapa da História: **Pontos críticos de desmatamento na Amazônia colombiana, parte 2** (<https://www.maaprogram.org/colombia2/>)

Este trabalho reflete uma importante colaboração com nossos colegas da Amazon Conservation Team (<http://www.amazonteam.org/>), financiada pela Fundação MacArthur.
